

MARIO FRANCISCOLO

UNA NUOVA SPECIE DI CONALIA MULS.

(Col. Mordellidae)

Conalia Debeauxi n. sp.

Forma generale assai stretta ed allungata, molto più lunga che larga (lunghezza, escluso il pigidio, mm. 4; larghezza, alla base delle elitre mm. 1).




Fig. 1: *Conalia Debeauxi* n. sp.: elitra. - Fig. 2: *Conalia Debeauxi* n. sp.: pronoto. - Fig. 3: *Conalia Debeauxi* n. sp.: tibia posteriore e primi due articoli tarsali posteriori.

Tegumenti neri; base delle antenne e femori delle zampe anteriori meno scuri; pubescenza giallo-cinerea, superiormente distribuita come

segue: base del pronoto pubescente soltanto lungo il lobo basale (fig. 2); ciascuna elitra con una macchia pubescente stretta, basale, ai lati dello scutello; con una seconda zona pubescente posta ad un quarto della lunghezza delle elitre, ed una terza zona postmediana, quasi del doppio più lunga della precedente, ristretta posteriormente e lasciante glabro soltanto l'apice; queste due ultime zone sono separate dal margine esterno e da quello suturale delle elitre a mezzo di una sottile striscia glabra delle elitre stesse (fig. 1).

Capo una volta e mezza più largo che lungo col vertice molto saliente. Primi articoli antennali (gli ultimi mancano nell'unico esemplare) molto più lunghi che larghi, poco dentati, lineari.

Protorace leggermente più lungo che largo, col lobo basale bene marcato, appena troncato all'apice, ed angoli posteriori subretti.

Elitre circa tre volte e mezzo più larghe che lunghe, molto strette.

Pigidio lungo due volte l'ipopigio, leggermente arcuato in basso ed acuminato.

Inserisco questa nuova specie nel genere *Conalia* Muls. per l'unica crenellatura che percorre dall'apice sin quasi al ginocchio tutta la tibia posteriore; i tarsi sono privi di crenellatura (fig. 3).

Olotipo etichettato: Sumatra: Pangherang-Pisang, X-1890 e III-1891, leg. E. Modigliani. Collezioni del Museo Civico di Storia Naturale « Giacomo Doria » di Genova.

Specie estremamente facile ad essere riconosciuta, oltre che per la strana e caratteristica distribuzione della pubescenza sulle elitre, anche per la forma strettissima ed allungata.

E' l'unica specie orientale sinora descritta del genere *Conalia*.

Le specie già note sono: *Conalia Baudii* Muls. et Rey, dell'Europa balcanica; *C. ebenina* Champion del Messico, Nicaragua, Antille; *C. fulvoplagiata* Champion dell'Isola di Grenada; *C. fasciata* Pic del Congo Belga.

Dedico la nuova specie, in segno di viva riconoscenza, al Prof. O. De Beaux, Direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Genova.
